

## Testículo No Descendido

Los testículos de los niños normalmente descienden de entre el abdomen hacia el escroto antes del nacimiento. Aproximadamente el 3% de los niños nacen con sus testículos no descendidos (esto significa que no están en el escroto). Los infantes prematuros tienen una incidencia más alta de tener sus testículos no descendidos. Aproximadamente a dos tercios de los niños que nacen con esta condición, les descenderán los testículos al escroto en cuanto lleguen a los seis meses de edad. La incidencia de los testículos no descendidos a la edad de seis meses es del 0.8%.

### RAZONES PARA LA CIRUGIA

Si el testículo de su hijo no ha descendido en cuanto el llegue a los seis meses de edad, es poco probable de que descienda espontáneamente. Las razones por las cuales se hace una operación incluyen:

**Fertilidad:** Datos científicos han demostrado que hombres con testículos no descendidos tienen una incidencia más alta de infertilidad. Lo más seguro es que esto sea secundario a un defecto primario en el testículo que causó que el testículo no descendiera. y/o debido a que el testículo no está en el escroto. Los datos también han enseñado que los testículos en una posición más alta (abdominal) son más propensos a tener problemas celulares. Aparentemente, los testículos sufren más daños entre más tiempo pasen fuera del escroto.

**Hernia:** Un testículo no descendido está asociado con una conexión entre el abdomen y el escroto llamado una "hernia". Durante el reparo al testículo, el saco de hernia es cerrado.

**Tumor:** Los testículos no descendidos tienen un mayor riesgo de desarrollar un tumor testicular. El riesgo es más alto para los testículos abdominales. Al traer el testículo al escroto por medio de cirugía, la familia, el paciente y el doctor pueden examinar el testículo periódicamente. Esto es muy importante en la detección temprana de tumores.

**Torsión:** Los testículos no descendidos tienen un mayor riesgo de una torsión espontánea y de parar el flujo sanguíneo al testículo.

**Cosmético/Psicológico:** Algunas familias sienten que es importante que su hijo tenga los dos testículos en el escroto para su bienestar psicológico.

### Testículo Retractable

Un testículo retractable es uno que parece ser no descendido, pero puede ser bajado con una manipulación suave hacia el escroto y se quedará por un corto tiempo. Esto ocurre generalmente en niños entre los 2 a los 7 años de edad quienes previamente tenían testículos descendidos normales. La retracción (o el jalón hacia arriba) en el testículo ocurre a causa de músculos sobreactivos los cuales rodean el cordón espermático. Los testículos retractables no necesitan cirugía, y bajan espontáneamente.